

چرا کودک من کم شنواست؟

به دلایل زیادی ممکن است کودک شما در بدو تولد یا در حین رشد دچار افت شنوایی عصبی-حسی شده باشد، البته دلیل این مسئله همیشه مشخص نمی شود.

ممکن است لازم باشد جهت تشخیص علت کم شنوایی کودکان، آزمایش هایی تکمیلی از فرزندتان گرفته شود.

در این قسمت بسیاری از دلایل رایج کم شنوایی آمده است. این دلایل معمولاً در دوران پیش از تولد، یا بلافاصله پس از آن رخ می دهند.

علتهای فیزیکی کم شنوایی

عوامل بسیاری می توانند کم شنوایی ایجاد کنند :

- عفونتهای خاص دوران بارداری ، مانند سرخجه
- مشکلات هنگام زایمان مانند تولد زودرس یا کمبود اکسیژن
- عوامل ژنتیکی ، ارثی
- عفونتهای گوش میانی
- عفونتهایی نظیر مننژیت ، مخملک ، سرخک یا سیاه سرفه
- صداهای خیلی بلند مانند آتش بازی ، موسیقی بلند یا صدای کارخانجات
- ضربات مانند صدمات وارده به سر

- در برخی موارد یافتن علت کم شنوایی بسیار مشکل است . اما در عین حال پزشکان فهرستی از علل « ناشناخته » دارند که کم شنوایی می تواند به یکی از آن عوامل مربوط باشد .

حدود نیمی از کم شنوایی های مادرزادی منشا ژنتیکی دارند(وتمور،۲۰۰۷) و متأسفانه کشور ما از معدود کشورهایی است که بیشترین علت کم شنوایی های مادرزادی(بیش از ۶۰ درصد) در آن ناشی از ازدواج های فامیلی است.

گاهی اوقات کم شنوایی در خانواده اتفاق می افتد بدون اینکه هیچ مورد مشابهی پیشتر در تاریخچه ی خانوادگی وجود داشته باشد. حدود ۷۰٪ این کودکان، ژن کم شنوایی را به ارث برده اند که البته این ژن هیچ مشکل دیگری غیر از کم شنوایی در آنها ایجاد نمی کند.

در ۳۰٪ دیگر ، ژن در گیر علت کم شنوایی قسمتی از یک نشانگان (سندروم) است